

**Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben**

**Gebrauchsinformation**

Bayofly® Pour-on 1g/100ml Lösung zum Übergießen für Rinder  
Cyfluthrin

**Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist**

Zulassungsinhaber:

Bayer Vital GmbH  
Geschäftsbereich Tiergesundheit  
51368 Leverkusen

Hersteller:

KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324  
24106 Kiel

**Bezeichnung des Tierarzneimittels**

Bayofly® Pour-on 1g/100ml Lösung zum Übergießen für Rinder  
Cyfluthrin

**Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile**

100 ml Lösung enthalten:

Wirkstoff(e):

1g Cyfluthrin

Sonstige Bestandteile deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

2-Octyldodecanol  
Aromatengemisch (C<sub>10</sub> – C<sub>13</sub> – Isomere)  
dünnflüssiges Paraffin

**Anwendungsgebiet(e)**

Gegen Fliegen- und Bremsenbefall bei Rindern auf der Weide einschließlich laktierender Milchkühe (Pyrethroid-sensitive Stämme von *Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Hydrotaea* spp., *Haematopota* spp.).

Um Resistenzentwicklungen von *Musca autumnalis* vorzubeugen, sollte Bayofly Pour-on nur eingesetzt werden, wenn die Empfindlichkeit der Fliegenpopulation vor Ort gegenüber dem Wirkstoff gesichert ist.

### Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei Kälbern. Bayofly® Pour-on sollte nur auf gesunde Hautpartien aufgetragen werden.

Nicht anwenden bei bekannter Resistenz von *Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Hydrotaea* spp., *Haematopota* spp. gegen Pyrethroide.

### Nebenwirkungen

Wie bei anderen Pyrethroiden kann es nach der Anwendung von Bayofly® Pour-on gelegentlich zu vorübergehenden Unruheerscheinungen kommen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

### Zieltierart(en)

Rind


### Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

#### Dosierungsanleitung

10 ml pro Tier (500 kg KGW: entsprechend 0,2 mg Cyfluthrin pro kg KGW)

#### Art der Anwendung

Bayofly® Pour-on ist eine gebrauchsfertige Lösung zum Aufgießen auf den Rücken. Mit der Dosierflasche wird Bayofly® Pour-on entlang der Rückenlinie der Tiere aufgetragen.



Laktierende Kühe sollen nach dem Melken behandelt werden.

#### Dauer der Anwendung

Die Behandlung ist je nach Fliegendruck nach 4 - 6 Wochen zu wiederholen.

### **Hinweise für die richtige Anwendung**

Entfällt.

### **Wartezeit**

Rind:

Essbares Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Tage

### **Besondere Lagerungshinweise**

Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Nicht unter 8°C lagern!

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

### **Besondere Warnhinweise**

#### Warnhinweise

Bayofly® Pour-on ist für den äußerlichen Gebrauch zur Insektenvernichtung bestimmt und darf weder von Tieren noch von Menschen innerlich aufgenommen werden.

Bayofly® Pour-on sollte von Nahrungsmitteln und Getränken sowie von Futtermitteln getrennt aufbewahrt werden.

#### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Der direkte Kontakt mit der Haut und der Schleimhaut sowie mit den Augen ist zu vermeiden. Bei der Anwendung des Arzneimittels sind Schutzhandschuhe zu tragen. Bei der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Bei versehentlichem Kontakt (Schleimhäute, Augen) gründlich mit Wasser ausspülen. Nach der Anwendung die Hände gründlich reinigen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Toxisch für Fische, Reptilien und Bienen. Darf nicht in Gewässer gelangen.

#### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Bei Gesichtsfiegen (*Musca autumnalis*) können Resistenzen nicht ausgeschlossen werden.

Die Anwendung von Bayofly Pour on sollte nur im Rahmen eines Gesamtkonzeptes erfolgen, das in erster Linie die Verbesserung des Hygienestatus und auch die Verwendung nicht-chemischer Mittel zur Fliegen- bekämpfung umfasst. Ergänzend kann der alternierende Einsatz von Insektiziden aus verschiedenen Wirkstoffklassen auf der Basis eines Schädlingsbekämpfungsplans erwogen werden.

Die Auswahl der Wirkstoffe sollte im Idealfall auf einer Empfindlichkeitsprüfung beruhen. Fragen Sie hierzu Ihren behandelnden Tierarzt.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Hinweise für den Fall der Überdosierung

Überdosierungen mit Bayofly® Pour-on können - wie bei anderen Pyrethroiden - zu vorübergehenden Anzeichen von Erregung und Unruhe wie Schwanzschlagen und Lecken der Flanken führen. Eine akzidentelle orale Aufnahme und großflächige Hautläsionen können zu Vergiftungserscheinungen wie z.B. Salivation, klonische Krämpfe und Parästhesien führen. Die Therapie kann nur symptomatisch und unterstützend erfolgen. Es gibt kein spezifisches Antidot gegen Pyrethrum und Derivate.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder Abfallmaterialien, sofern erforderlich**

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

**Genehmigungsdatum der Packungsbeilage**

...

**Weitere Angaben**

Darreichungsform und Inhalt

Lösung zum Übergießen, 500 ml

Stoff- oder Indikationsgruppe

Ektoparasitizid

Apothekenpflichtig

Zul. Nr.: 9907.00.00

Ch.-B.:

Verwendbar bis: